

Cause di sospensione temporanea dalla donazione

- **Ciclo mestruale**, si consiglia di rispettare **almeno 6 giorni** di sospensione prima e dopo
- **Febbre** superiore ai 37.5°C, **2 settimane** dopo la cessazione dei sintomi
- **Influenza**, **2 settimane** dopo la cessazione dei sintomi
- Uso occasionale e sporadico di **sostanze stupefacenti** limitato ai cannabinoidi, **previo giudizio positivo del medico**
- **Tatuaggi** o **body piercing** o **foratura delle orecchie**, **4 mesi** salvo complicazioni
- **Agopuntura** (se non eseguita da professionisti qualificati con ago usa e getta), **4 mesi**
- **Cure odontoiatriche**, cure di minore entità da parte di dentista o odontoigienista, **48 ore**
- **Intervento chirurgico minore** (interventi ambulatoriali in anestesia locale, come estrazione e devitalizzazione dei denti), **1 mese**
- **Intervento chirurgico maggiore**, **4 mesi** in condizioni di recupero dello stato di salute



- **Assunzione FANS** (Aspirina, Aulin, Moment) altri analgesici e antipiretici (ASA, pirazoloni, paracetamolo-Tachipirina), **5 giorni** dall'ultima somministrazione se in terapia, se occasionale nessuna sospensione
- **Antibiotici, antimicotici, antipsoriasici, antivirali**, **15 giorni** dall'ultima somministrazione
- **Psicofarmaci**, **6 mesi** dal termine della terapia, riammissione previa certificazione specialistica
- **Vaccini**, **48 ore**
- Un **nuovo partner sessuale** (sia per relazioni eterosessuali che omosessuali), **4 mesi**
- **Convivenza prolungata** e abituale con soggetto, non partner sessuale, con **positività per HBsAg** e/o anti HCV, fino a **4 mesi** dopo la cessazione della convivenza. Si applica anche se il donatore è vaccinato per l'epatite B
- **Convivenza occasionale** con soggetto, non partner sessuale, con **positività per HBsAg** e/o anti HCV, **4 mesi** dall'ultima esposizione. Si applica anche se il donatore è vaccinato per l'epatite B



- **Lesioni da ago** o altre esposizioni accidentali a strumenti che veicolano sangue, **4 mesi**
- **Esame endoscopico** con strumenti flessibili, **4 mesi**
- **Esame con utilizzo di liquido di contrasto**, **15 giorni**
- **Toxoplasmosi**, **6 mesi** dalla completa guarigione
- **Mononucleosi infettiva**, **6 mesi** dalla completa guarigione
- **Trasfusioni di emocomponenti** o somministrazione di emoderivati, **4 mesi**
- **Trapianto di tessuti** o **cellule**, **4 mesi**
- **Gravidanza**, **durante la gravidanza** e **6 mesi dopo parto** o interruzione di gravidanza
- **Viaggi in aree tropicali**, **6 mesi** dal rientro salvo complicazioni o epidemie
- **Viaggi in paesi al di fuori delle aree tropicali**, dove è segnalata la presenza di malattie tropicali
- **Puntura di zecca**, **3 mesi**

